がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分				1コース期間	2週間
大腸がん		2WCetu/mFOLFOX6		☒ 進行・再発がん ☐ 術後補助化学療法 ☒ 術前補助化学療法				1コース期間	2週間
								総コース数	病状進行まで
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	14	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分					セツキシマブによる infusion reaction 予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 6.6mg	点滴静注	5分					悪心嘔吐予防
3	セツキシマブ注射液 生理食塩液	500mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間*					*初回は2時間、2回目は 90分、3回目以降は1時 間で投与可能
4	レボホリナートカルシウム注射用 5%ブドウ糖注射液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					4と5は同時投与
5	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					4と5は同時投与
6	フルオロウラシル注射液 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	急速静注	5分					
7	フルオロウラシル注射液 (生理食塩液)	2400mg/m ² (合計130mL)	持続静注	46時間					
8	デキサメタゾン錠4mg	8mg/body	経口		朝食後	朝食後			悪心嘔吐予防
9	ミノサイクリン錠	100mg/body	経口	夕食後					セツキシマブによる皮 膚毒性予防

更新日 2022年8月