

がん化学療法レジメン

| がん種 | | レジメン（略語）名称 | | 抗がん薬 適応区分 | | | | 1コース期間 | | 3週間 | |
|-----|----------------------------|-------------------------------|------|--|-------------|-------------|-----|--------|----|------------------------------------|--------|
| 乳がん | | AC | | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 | | | | | | 術後：4コース 進行再発：制限なし (ADM上限量まで) | |
| 番号 | 医薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 21 | 備考 | |
| 1 | パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注 | 0.75mg(50mL) 9.9mg | 点滴静注 | 5分 | | | | | | | 悪心嘔吐予防 |
| 2 | ドキシルピシン注射用 生理食塩液 | 60mg/m ² 50mL | 点滴静注 | 5分 | | | | | | | |
| 3 | シクロホスファミド注射用 5%ブドウ糖液 | 600mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | | | | | | | |
| 6 | アプレピタントカプセル | | 経口 | 点滴前 125mg | 朝食後 80mg | 朝食後 80mg | | | | | 悪心嘔吐予防 |
| 7 | デキサメタゾン錠 ラベプラゾール錠 | 8mg/body 10mg/body | 経口 | | 朝食後 | 朝食後 | 朝食後 | | | | 悪心嘔吐予防 |

更新日 2021年2月