

がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間	2週間	
大腸がん		Beva/mFOLFOX6		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法			1コース期間	2週間	
							総コース数	病状進行まで	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	14	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分					アレルギー予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 6.6mg	点滴静注	15分					悪心嘔吐予防
3	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	90分*					2回目以降は30分で投与可能
4	レボホリナートカルシウム注射用 5%ブドウ糖注射液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					4と5は同時投与
5	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					4と5は同時投与
6	フルオロウラシル注射液 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	急速静注	5分					
7	フルオロウラシル注射液 (生理食塩液)	2400mg/m ² (合計100mL)	持続静注	46時間					
8	デキサメタゾン錠4mg	8mg/body	経口		朝食後	朝食後			悪心嘔吐予防

更新日 2021年2月