

# がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間		2週間	
大腸がん		Beva/FOLFOXIRI		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法			1コース期間		2週間	
							総コース数		12コース、その後PDまでCPT、I-OHP抜くこともある	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	8	14	備考
1	クロルフェニラミン注	5mg	点滴静注	5分						アレルギー予防
	ファモチジン注射用	20mg								
	生理食塩液	50mL								
2	パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg(50mL)	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
	デキサメタゾン注	9.9mg								
3	ベバシズマブ注射液	5mg/kg	点滴静注	1時間*						*2回目は30分で投与可能
	生理食塩液	100mL								
4	イリノテカン注射液	165mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間						
	5%ブドウ糖注射液	250mL								
5	オキサリプラチン注射液	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間						5と6は同時投与
	5%ブドウ糖注射液	250mL								
6	レボホリナートカルシウム注射用	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間						5と6は同時投与
	5%ブドウ糖注射液	250mL								
7	フルオロウラシル注射液 (生理食塩液)	3200mg/m <sup>2</sup> (合計240mL)	持続静注	48時間						
8	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg				悪心嘔吐予防
9	デキサメタゾン錠	8mg/body	経口		朝食後	朝食後				悪心嘔吐予防

更新日 2021年2月