がん化学療法レジメン

がん種	レジメン（略語）名称	抗がん薬 適応区分	1コース期間	2週間
大腸がん	Beva/FOLFOXIRI	■進行・再発がん □術後補助化学療法 □術前補助化学療法	総コース数	12ｺｰｽ、その後PDまでCPT、I-OHP抜くこともある

番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	‥	8	14	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分						アレルギー予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 9.9mg	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
3	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	1時間*						*2回目は30分で投与可能
4	イリノテカン注射液 5%ブドウ糖注射液	165mg/㎡ 250mL	点滴静注	1時間						
5	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	85mg/㎡ 250mL	点滴静注	2時間						5と6は同時投与
6	レボホリナートカルシウム注射用 5%ブドウ糖注射液	200mg/㎡ 250mL	点滴静注	2時間						5と6は同時投与
7	フルオロウラシル注射液 （生理食塩液）	3200mg/㎡ （合計130mL）	持続静注	48時間						
8	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg				悪心嘔吐予防
9	デキサメタゾン錠	8mg/body	経口		朝食後	朝食後				悪心嘔吐予防

更新日 2022年8月

（公財）がん研究会有明病院　薬剤部