

# がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間		2週間	
大腸がん		Beva/FOLFOXIRI		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法			1コース期間		2週間	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	14	備考	
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分						アレルギー予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg (50mL) 9.9mg	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
3	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	1時間*						*2回目以降は30分で投与可
4	イリノテカン注射液 5%ブドウ糖注射液	165mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	1時間						
5	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	85mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間						
6	レボホリナート注射用 5%ブドウ糖注射液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間						Rp5と同時に投与開始
7	フルオロウラシル注射液 (生理食塩液)	3200mg/m <sup>2</sup> total130mL	点滴静注		48時間					
8	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg				悪心嘔吐予防
9	デキサメタゾン錠	8mg	経口		1日1回 朝食後	1日1回 朝食後				悪心嘔吐予防

更新日 2021年8月