

がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間		21日間	
大腸がん		Beva/XELOX		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法			総コース数		病状進行まで	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	15	21	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分						アレルギー予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 6.6mg	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
3	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	点滴静注	90分*						*2回目以降は30分で投与可能
4	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間						
5	5%ブドウ糖注射液	50mL	点滴静注	5分						
6	カペシタビン錠	2000mg/m ²	経口	1日2回朝夕食後 1日目夕～15日目朝						
7	デキサメタゾン錠	8mg/body	経口		朝食後	朝食後				悪心嘔吐予防

更新日 2021年2月