

がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間	3週間	
卵巣がん		TC/Beva		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法			総コース数	1～6（～8）コース 術後症例は術後4週以降でBeva併用	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	21	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 デキサメタゾン注 生理食塩液	5mg 20mg 19.8mg 50mL	点滴静注	5分					アレルギー予防 悪心嘔吐予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg（50mL）	点滴静注	30分					悪心嘔吐予防
3	パクリタキセル注射液 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	3時間					
4	カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC = 6 250mL	点滴静注	30分					AUC(6)x(Ccr+25)
5	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	90分*					*初回は90分で投与。2回目は60分で投与。3回目以降は30分で投与可
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分					
7	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg			悪心嘔吐予防

更新日 2021年8月