

がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分			1コース期間			3週間	
子宮頸がん		TC/Beva（子宮頸がん）		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法						CR、PD、毒性出現、照射開始まで	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	4	..	21	備考	
1	デキサメタゾン注 クロルフェニラミン注射液 ファモチジン注射液 生理食塩液	19.8mg 5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分							悪心嘔吐予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg(50mL)	点滴静注	30分							悪心嘔吐予防
3	パクリタキセル注射液 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	3時間							
5	カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC (5) x (CC r +25) 250mL	点滴静注	30分							
6	ベバシズマブ注射液 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	90分*							*2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分							
8	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg					悪心嘔吐予防

更新日 2021年2月