

# がん化学療法レジメン

| がん種 |                                              | レジメン（略語）名称                    |      | 抗がん薬 適応区分                          |            | 1コース期間 |    | 2週間  |                   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|------------|--------|----|------|-------------------|
| 乳がん |                                              | ddPAC                         |      | □進行・再発がん<br>■術後補助化学療法<br>■術前補助化学療法 |            | 総コース数  |    | 4コース |                   |
| 番号  | 医薬品名                                         | 1日投与量                         | 投与方法 | 1                                  | 2          | ..     | 14 | 備考   |                   |
| 1   | デキサメタゾン注<br>クロルフェニラミン注<br>ファモチジン注射用<br>生理食塩液 | 19.8mg<br>5mg<br>20mg<br>50mL | 点滴静注 | 5分                                 |            |        |    |      | アレルギー予防<br>悪心嘔吐予防 |
| 2   | グラニセトロン点滴静注バッグ                               | 3mg（50mL）                     | 点滴静注 | 15分                                |            |        |    |      | 悪心嘔吐予防            |
| 3   | パクリタキセル注射液<br>生理食塩液                          | 175mg/m <sup>2</sup><br>500mL | 点滴静注 | 3時間                                |            |        |    |      |                   |
| 4   | 生理食塩液                                        | 50mL                          | 点滴静注 | 5分                                 |            |        |    |      |                   |
| 5   | ペグフィルグラスチムキット                                | 3.6mg/body                    | 皮下注射 |                                    | ワン<br>ショット |        |    |      | 感染症予防<br>2日目以降に実施 |

更新日 2021年8月