

# がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分				1コース期間	2週間	
大腸がん		mFOLFOX6		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法				総コース数	進行再発：病状進行まで 術後：12コース	
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	8	14	備考
1	クロルフェニラミン注 ファモチジン注射用 生理食塩液	5mg 20mg 50mL	点滴静注	5分						アレルギー予防
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 6.6mg	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
3	レボホリナートカルシウム注射用 5%ブドウ糖注射液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間						3と4は同時投与
4	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖注射液	85mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間						3と4は同時投与
5	フルオロウラシル注射液 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	急速静注	5分						
6	フルオロウラシル注射液 (生理食塩液)	2400mg/m <sup>2</sup> (合計100mL)	持続静注	46時間						
7	デキサメタゾン錠4mg	8mg/body	経口		朝食後	朝食後				悪心嘔吐予防

更新日 2021年2月